



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

BIOSERVICES INTERNATIONAL
BVBA
JAGERSHOEK 13
8570 VICHTE

Correspondent :

VANCOMPENOLLE BRAM

Attaché

02 524 7388

Onze referen : :

Inschrijvingsnummer : 29890

Datum : 07/10/2020

1/18

Betreft : verlenging

**VERGUNNING VOOR PARALLELHANDEL VAN EEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF**

1. Algemene bepalingen

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt aan :

BIOSERVICES INTERNATIONAL BVBA
JAGERSHOEK 13
8570 VICHTE

de vergunning verleend voor de parallelhandel van het product :

OMNI INSECT

vanuit de lidstaat vermeld op de aanvraag

onder het nummer : **1185G/P**

voor : **AMATEURGEBRUIK**

als : Insecticide

referentieproduct : 9868G/B



De houder van de vergunning voor parallelhandel moet de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in toepassing van artikel 34 van het KB van 28/02/1994 zonder uitstel en schriftelijk op de hoogte brengen van de invoer, de opslagplaats en de omvang van elke ingevoerde partij, lotnummer en productiedatum inbegrepen. Deze moet gedurende 48 uur na de notificatie ter beschikking gehouden worden van de voornoemde Dienst. Gelieve hiertoe het hierbijgevoegde formulier te gebruiken en het per fax of bij voorkeur per email op te sturen.

Ten minste één verzegelde en van het oorspronkelijk etiket voorziene verpakking moet gedurende de geldigheidsduur van de vergunning ter plaatse ter beschikking van het FAVV gehouden worden.

2. Nadere identificatie van het product

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

DELTAMETHRIN 15 g/l

Algemene opmerking :

/

2.3. Formuleringstype : EW (Emulsie, olie in water)

3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage waarin de bewoordingen van de erkenningsakte van het referentieproduct zijn overgenomen.

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

4.1. Gevarencategorie(ën) :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan :

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

4,9

4.5. Andere vermeldingen :

- Toegelaten verpakkingen: 60 ml HDPE flacons die 20 of 50 ml bevatten, met 25 ml maatbeker.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone

ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

- SPE8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken.
- SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de vergunning.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
- EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5. Geldigheidsduur van de vergunning

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 07/10/2020 tot en met 31/10/2021

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze vergunning tot parallelhandel is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Bemerking	: - Max. 3 toepassingen per teelt. - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met Rosa spp.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: kevers (adulten, larven)(Coleoptera (Chrysomelidae, Halticini, Curculionidae...))
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: groentevliegen(Anthomyiidae, Psilidae,...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: wortelen (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: kevers (adulten, larven)(Coleoptera (Chrysomelidae, Halticini, Curculionidae...))
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: radijs (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: kevers (adulten, larven)(Coleoptera (Chrysomelidae, Halticini, Curculionidae...))
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: rammenas en rettich (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.

Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: schorseneren (open lucht)
Ter bestrijding van	: kevers (adulten, larven)(Coleoptera (Chrysomelidae, Halticini, Curculionidae...))
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1 toepassing, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: mineerrupsen/motten(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: koolraap (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: mineerrupsen/motten(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: mierikswortel (open lucht)
Bemerking	: Max. 2 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen

Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **uien (drooggeogste) (open lucht)**

Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)

Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Ter bestrijding van : mineerrupsen/motten(Agromyzidae)

Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **bosuien (lente-ui) (open lucht)**

Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)

Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Ter bestrijding van : mineerrupsen/motten(Agromyzidae)

Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **sjalot (open lucht)**

Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)

Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Ter bestrijding van : mineerrupsen/motten(Agromyzidae)

Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **knoflook (open lucht)**

Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)

Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Ter bestrijding van : mineerrupsen/motten(Agromyzidae)

Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **tomaten (open lucht)**

Bemerking : Max. 3 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)

Dosis / Concentratie : 8 ml in 10-15 l water/100 m², 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe

Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: aubergine/eierplant en pepino (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: courgette/patisson (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.

Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: komkommer (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: komkommer (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: augurk (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per jaar
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: augurk (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per jaar

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: suikermaïs (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: spruitkool (open lucht)
Bemerking	: Max. 2 toepassingen per jaar
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: broccoli (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per jaar
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: mineerrupsen/motten(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: mineerrupsen/motten(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
Bemerking	: Max. 2 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: mineerrupsen/motten(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)
Bemerking	: Max. 2 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Ter bestrijding van	: mineerrupsen/motten(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipe
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 2 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: witloofwortelteelt (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren) (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veldsla (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: veldsla (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua, Euxoa...)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeogst, met peul) (open lucht)
Bemerking	: Max. 3 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10 l water/100 m ² , 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Te behandelen	: groengeogste erwten (met peul) (open lucht)
Bemerking	: Max. 2 toepassingen per teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 8 ml in 10-15 l water, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 5 ml in 10-15 l water/100 m ² , 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, tot afdruipen.

Ter bestrijding van : kevers (adulten, larven)(Coleoptera
 (Chrysomelidae, Halticini, Curculionidae...))
 Dosis / Concentratie : 5 ml in 10-15 l water/100 m², 1-2 toepassingen
 met een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Veiligheidstermijn : 7 dagen
 Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **prei (open lucht)**
 Bemerking : Max. 3 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa,
 Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua,
 Euxoa...)
 Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-3 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Veiligheidstermijn : 7 dagen
 Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **asperge (open lucht)**
 Toepassingsstadium : na de oogst
 Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
 Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Ter bestrijding van : rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa,
 Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua,
 Euxoa...)
 Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Te behandelen : **asperge (onder bescherming)**
 Toepassingsstadium : na de oogst
 Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
 Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Ter bestrijding van : rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa,
 Orthosia, Thaumetopoeidae, Agrotis, Noctua,
 Euxoa...)
 Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **aardappelen (open lucht)**
 Bemerking : Max. 2 toepassingen per teelt

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
 Dosis / Concentratie : 8 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Ter bestrijding van : kevers (adulten, larven)(Coleoptera
 (Chrysomelidae, Halticini, Curculionidae...))
 Dosis / Concentratie : 5 ml in 10 l water/100 m², 1-2 toepassingen met
 een interval van 14 dagen, tot afdruipe n.
 Veiligheidstermijn : 7 dagen
 Risicobeperkende maatregelen : 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Algemene opmerking

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS02



GHS09

Gevarenaanduidingen (H-zinnen) :

H226

H410

Aanvullende informatie (EUH-zinnen) :

EUH208

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P101

P102

P210

P270

P273

P391

P501

VERKLARING VAN INVOER

Op te sturen naar : DG Dier, Plant en Voeding (DG4)
Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Eurostation, blok II, 7e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
fax: 02 524 72 99
email: paralleltrade@gezondheid.belgie.be

Vergunningsnummer voor de parallelhandel :

Product :

Land van waaruit de invoer is gebeurd :

Datum van invoer :

Hoeveelheid ingevoerd product (kg of l) :

Verpakking : verpakkingen van kg/l

Lotnummer en productiedatum van het originele product :

Opslagplaats van het ingevoerde product (volledig adres) :

(plaats)

(datum)

Zeer duidelijk de naam en de
hoedanigheid van de ondertekenaar
aanduiden :

Aldus volledig en naar
waarheid ingevuld

.....
.....
Handtekening